

PRIMA CULTIVAR

Acidi grassi monoinsaturi Extravergine

Acido Oleico (C 18:1)

81,60

55 - 83 %

Acido Palmitoleico (c 16:1)

0,79

0,3 - 3,5 %

Acido Eicosenoico (C 20:1)

0,34

≤ 0,4 %

Acidi grassi polinsaturi

Acido Linoleico (C 18:2)

3,46

3,5 - 21 %

Acido Linolenico (C 18:3)

0,84

≤ 1,0 %

Acidi grassi saturi

Acido Palmitico (C 16:0)

10,69

7,5 - 20 %

Acido Stearico (C 18:0)

1,49

0,5 - 5 %

Acido Arachico (C 20:0)

0,30

≤ 0,6 %

Frazione insaponificabile

Polifenoli totali ()

554,86

Tocoferoli ()

176,00

SECONDA CULTIVAR:

Acidi grassi monoinsaturi Extravergine

Acido Oleico (C 18:1)

78,10

55 - 83 %

Acido Palmitoleico (c 16:1)

0,73

0,3 - 3,5 %

Acido Eicosenoico (C 20:1)

0,31

≤ 0,4 %

Acidi grassi polinsaturi

Acido Linoleico (C 18:2)

5,79

3,5 - 21 %

Acido Linolenico (C 18:3)

1,07

≤ 1,0 %
Acidi grassi saturi
Acido Palmitico (C 16:0)
10,18
7,5 - 20 %
Acido Stearico (C 18:0)
2,69
0,5 - 5 %
Acido Arachico (C 20:0)
0,38
≤ 0,6 %
Frazione insaponificabile
Polifenoli totali ()
380,00
Tocoferoli ()
120,00

TERZA CULTIVAR:

Acidi grassi monoinsaturi Extravergine

Acido Oleico (C 18:1)
80,00
55 - 83 %
Acido Palmitoleico (c 16:1)
0,77
0,3 - 3,5 %
Acido Eicosenoico (C 20:1)
0,26
≤ 0,4 %
Acidi grassi polinsaturi
Acido Linoleico (C 18:2)
3,60
3,5 - 21 %
Acido Linolenico (C 18:3)
0,89
≤ 1,0 %
Acidi grassi saturi
Acido Palmitico (C 16:0)
10,00
7,5 - 20 %
Acido Stearico (C 18:0)
2,89
0,5 - 5 %
Acido Arachico (C 20:0)
0,47
≤ 0,6 %
Frazione insaponificabile
Polifenoli totali ()
62,16
Tocoferoli ()
279,00